

السؤال الأول: (45 درجة)

ليكن المؤثر الخطي $T: R^3 \rightarrow R^3$ والمعرف على النحو التالي:

$$T(x, y, z) = (x, y, z) ; \forall (x, y, z) \in R^3$$

- (1). بين ما إذا كان هذا المؤثر قابل للقلب أم لا.
- (2). أوجد كثيري الحدود، المميز والأصغري، لهذا المؤثر الخطي.
- (3). أوجد القيم الذاتية والأشعة الذاتية الموافقة لها للمؤثر الخطي السابق T .
- (4). استنتج من الطلب السابق ما إذا كان هذا المؤثر الخطي قطبياً أم لا.

السؤال الثاني: (25 درجة)

- (1). بفرض أن A مصفوفة معرّفة فوق الحقل العندي K . برهن أن كثير الحدود المميز للمصفوفة A الحدود المميز لمنقولها.

$$|x E - A| = |x E - A^T| = |x E^T - A^T|$$

$$E^T = E$$

(2). لتكن المصفوفة:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

أوجد مقلوب المصفوفة السابقة A باستخدام نظرية كيلبي - هاملتون.

السؤال الثالث: (30 درجة)

بفرض أن $B = \{f_1, f_2\}$ قاعدة للفضاء الثنوي $(R^2)^*$ ، حيث أن:

$$f_1 = -x + 3y, f_2 = x - 2y$$

- (1). أوجد القاعدة $A = \{v_1, v_2\}$ للفضاء الشعاعي R^2 ، والتي B هي قاعدتها الثنوية.
- (2). اكتب الشكل الخطي $f = -2x + 3y$ من الفضاء الثنوي $(R^2)^*$ بدلالة أشعة القاعدة B .
- (3). اكتب الشعاع $v = (3, -7)$ من R^2 بدلالة أشعة القاعدة A .

$$3(1) + 3(-7) = 3 - 21 = -18$$

$$-3 - 21 = -24$$

$$+17$$

2017/06/19

د. غسان

$$A^{-1} \cdot 4E = x$$

$$A^{-1} = \frac{x}{4E}$$

السؤال الأول: (35 درجة)

(i). لنوجد أولاً مصفوفة هذا المؤثر الخطي، وعندها يكون كثير الحدود المميز والأصغري للمؤثر الخطي T هما كثيرا الحدود المميز والأصغري لمصفوفة هذا المؤثر.

$$\left. \begin{aligned} T(1,0,0) &= (2,1,2) \\ T(0,1,0) &= (0,2,0) \\ T(0,0,1) &= (0,0,2) \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

إن كثير الحدود المميز لمصفوفة المؤثر الخطي السابقة A هو:

$$\varphi(x) = |xE - A| = (x - 2)^3$$

أما كثير الحدود الأصغري للمصفوفة A فهو أحد كثيرات الحدود التالي:

$$f_1(x) = (x - 2), \quad f_2(x) = (x - 2)^2, \quad f_3(x) = (x - 2)^3$$

$$f_1(A) = (A - 2E)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq 0$$

$$f_2(A) = (A - 2E)^2$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = 0$$

ما يعني أن كثير الحدود الأصغري للمصفوفة A هو:

$$m(x) = (x - 2)^2$$

وهو بنفس الوقت كثير الحدود الأصغري للمؤثر الخطي المعطى T .

(ii). من أجل شعاع اختياري $u = (a, b, c)$ من الفضاء الشعاعي الجزئي U نجد أن:

$$T(a, b, c) = (2a, a + 2b, 2c + 2a)$$

$$= (2a, a + 2b, 2(a + 2b) + 2a)$$

$$= (2a, a + 2b, 4a + 4b)$$

ولأن المركبة الثالثة من $T(a, b, c)$ تساوي المركبة الأولى مضافاً إليها مثلي المركبة الثانية فإن $T(a, b, c) \in U$ ، وبالتالي فالفضاء الجزئي U هو فضاء جزئي مستقر بالنسبة للمؤثر الخطي المعطى T .

السؤال الثاني: (35 درجة)

(1). بما أن v شعاعاً ذاتياً للمؤثر الخطي T ويقابل القيمة الذاتية λ فيكون:

$$T(v) = \lambda v$$

ويكون أيضاً :

$$T(\alpha v) = \alpha T(v) = \alpha(\lambda v) = \lambda(\alpha v)$$

ولأن $\alpha v \neq 0$ ، كون $\alpha \neq 0$ و $v \neq 0$ نستنتج من العلاقة السابقة أن الشعاع αv يكون شعاعاً ذاتياً للمؤثر الخطي T ويقابل القيمة الذاتية λ .

(2). بفرض أن $P = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \neq 0$ شعاع ذاتي للمصفوفة A ويقابل القيمة الذاتية λ ، فيكون:

$$A.P = \lambda P \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = \lambda x_1 \\ x_2 + 3x_3 = \lambda x_2 \\ 2x_3 = \lambda x_3 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} (1-\lambda)x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ (1-\lambda)x_2 + 3x_3 = 0 \\ (2-\lambda)x_3 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

ويكون لجملة المعادلات الخطية المتجانسة السابقة حلاً غير الحل الصفري عندما يكون معين الأمثال صفراً، أي :

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 3 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)(1-\lambda)(2-\lambda) = 0$$

وتكون القيم الذاتية للمصفوفة A هي $\lambda_{1,2} = 1$ ، $\lambda_3 = 2$.

لإيجاد الأشعة الذاتية الموافقة للقيمة الذاتية $\lambda_{1,2} = 1$ نعوض في (*) فنجد :

$$0 \cdot x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$$

$$0x_2 + 3x_3 = 0$$

$$x_3 = 0$$

بالحل المشترك لجملة المعادلات السابقة نحصل على الشعاع الذاتي الوحيد الموافق للقيمة الذاتية $\lambda_{1,2} = 1$ وهو :

$$P_1 = (1, 0, 0)$$

لإيجاد الأشعة الذاتية الموافقة للقيمة الذاتية $\lambda_3 = 2$ نعوض في (*) ، وبالحل المشترك لجملة المعادلات الخطية

الناتجة نجد أن الشعاع الذاتي الوحيد الموافق للقيمة الذاتية $\lambda_3 = 2$ هو $P_2 = (7, 3, 1)$.

سؤال الثالث: (30 درجة)

(1). بفرض أن القاعدة الثنوية A^* للقاعدة $A = \{v_1 = (2,3), v_2 = (3,4)\}$ هي:
 $A^* = \{f_1(x, y) = a_1x + b_1y, f_2(x, y) = a_2x + b_2y; \forall x, y \in R\}$
 فيكون من أجل إيجاد f_1 :

$$f_1(v_1) = 2a_1 + 3b_1 = 1$$

$$f_1(v_2) = 3a_1 + 4b_1 = 0$$

بالحل المشترك لجملة المعادلات السابقة نجد أن:

$$f_1(x, y) = -4x + 3y$$

ومن أجل إيجاد f_2 :

$$f_2(v_1) = 2a_2 + 3b_2 = 0$$

$$f_2(v_2) = 3a_2 + 4b_2 = 1$$

و بالحل المشترك لجملة المعادلات السابقة نجد أن:

$$f_2(x, y) = 3x - 3y$$

وبالتالي تكون القاعدة الثنوية A^* للقاعدة $A = \{v_1 = (2,3), v_2 = (3,4)\}$ هي:

$$A^* = \{f_1(x, y) = -4x + 3y, f_2(x, y) = 3x - 2y; \forall x, y \in R\}$$

(2). كتابة الشكل الخطي $f(x, y) = -8x + 4y$ بدلالة أشعة القاعدة A^* :

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(v_1) \cdot f_1 + f(v_2) \cdot f_2 \\ &= (-16 + 12)f_1 + (-24 + 16)f_2 \\ &= -4f_1 - 8f_2 \end{aligned}$$

(3). كتابة الشعاع $v = (-12, 6)$ بدلالة أشعة القاعدة A .

$$\begin{aligned} v &= f_1(v)v_1 + f_2(v)v_2 \\ &= f_1(-12, 6)v_1 + f_2(-12, 6)v_2 \\ &= (48 + 18)v_1 + (-36 - 12)v_2 \\ &= 66v_1 - 48v_2 \end{aligned}$$

د. غسان نعمه